

Multi-Mam BABYDENT

Lajša izraščanje zobkov in blaži težave, povezane z njim

Multi-Mam



PRED UPORABO GELA MULTI-MAM BABYDENT NATANČNO PREBERITE NAVODILA IN JIH SHRANITE.

Multi-Mam BabyDent - Lajša izraščanje zobkov in blaži težave, povezane z njim

Gel je izdelan posebej za dojenčke, ki jim izraščajo zobki.

- ✓ Je naraven, varen in neškodljiv, tudi če ga otrok pogoltne.
- ✓ Ne vsebuje konzervansov, alkohola ali sestavin živalskega izvora.
- ✓ Brez sladkorja.
- ✓ Ne poškoduje ali obarva zobkov.
- ✓ Ima prijeten okus.
- ✓ Ne vsebuje sintetičnega anestetika.
- ✓ Osnovna sestavina izdelka je patentiran 2QR-kompleks.

Delovanje gela Multi-Mam BabyDent

Multi-Mam BabyDent pomirja dlesni ter zmanjša neugodje in otekanje dlesni pri izraščanju zobkov. Multi-Mam BabyDent se odlično oprime dlesni in oblikuje mehak sloj, ki pomirja občutljive dlesni. Osnovna sestavina bioaktivnega gela je patentiran 2QR-kompleks. To je naravna sestavina, ki se pridobiva iz zdravih rastlin in vsebuje bioaktivne molekule, imenovane polisaharidi.

Indikacije

- Izraščanje zobkov

Navodila za uporabo

Gel Multi-Mam BabyDent v obilni količini nanosite na občutljive otrokove dlesni tako pogosto, kot želite doseči pomirjajoč učinek. S čistim prstom ali z mehko zobno krtačko gel vmasirajte v dlesni. Da bi omogočili čim daljše delovanje, je priporočljivo, da otrok po nanosu gela nekaj časa ničesar ne pije, prav tako poskusite preprečiti, da bi gel z jezikom odstranil z dlesni.

Za dodaten pomirjajoč učinek lahko gel Multi-Mam BabyDent hranite v hladilniku (pri 2 do 8 °C). Ohlajen gel nemudoma ublaži neugodje.

Drug primeren način nanosa je, da nekaj gela iztisnete neposredno na dudo ali grizalo na mestu, kjer pride v stik z dlesnimi.

Multi-Mam BabyDent je prijeten blagodejen gel, ki ga lahko nanesete tudi na kožne izpuščaje, nastale zaradi povečanega slinjenja.

Navodila za uporabo pri slinjenju

Nanesite majhno količino gela na razdraženo kožo okrog ust.

Aktivne sestavine

Galactoarabinan Polyglucuronic Acid Crosspolymer*,
ksilitol, hialuronska kislina

*2QR-kompleks: patentirani bioaktivni polisaharidi. www.2QR.com



Barva gela Multi-Mam BabyDent se lahko razlikuje od tube do tube. Razlike nastajajo zaradi osnovne naravne sestavine, imenovane 2QR-kompleks. Barva gela lahko variira od prosojne do rahlo potemnjenejava jantarjevega odtenka. Barva gela ne vpliva na varnost ali učinkovitost izdelka.

Alergijske reakcije na sestavine gela Multi-Mam BabyDent so zelo redke. Priporočamo, da pred prvo uporabo naneseš nekaj gela na notranjo stran otrokove podlakti. Če se pojavi srbeča rdečica, svetujemo, da gela ne uporabljate.

Nezdružljivost z zdravili

Gel Multi-Mam BabyDent ne vpliva na delovanje zdravil in ga lahko kombinirate z njimi.

Shranjevanje in embalaža

Multi-Mam BabyDent shranjujte nedosegljivo otrokom, v originalni embalaži, pri temperaturi od 2 do 25 °C. Rok trajanja je odtisnjen na tubi in na dnu škatlice.

Splošne informacije

Izraščanje zobkov:

Dojenčku začnejo izraščati zobki med 6. in 24. mesecem starosti, včasih tudi prej.

Težave, ki se pojavijo med izraščanjem zobkov

Prvi znaki in simptomi izraščanja zobkov so: tiščanje rok ali drugih predmetov v usta, slinjenje in otekanje dlesni na mestih, kjer na površje prodirajo zobki. Nekaterim otrokom pri izraščanju zob oteče in povzroča ena ličnica. Večina težav se pojavi do štiri dni pred izrastom zob in traja do tri dni po njem. V tem obdobju imajo lahko dojenčki različne težave.

Nekateri so enostavnejši, npr. nelagodje v predelu dlesni in čeljusti, otekanje dlesni, intenzivnejše slinjenje, pojavijo pa se lahko tudi bolj sistemske težave, kot so: povišana telesna temperatura, driska in zmanjšana odpornost. Tudi vedenjske težave so lahko izražene, npr.: razdražljivost, motnje spanja in hranjenja.

Opozorilo!

Driska, povišana telesna temperatura in izpuščaji niso vedno povezani z izraščanjem zobkov. Če pri otroku opazite omenjene simptome in ne veste, kaj je vzrok težav, je priporočljivo, da se posvetujete z zdravnikom.

Nelagodje/otekline v obdobju izraščanja zobkov

Izraščanje zobkov na splošno povezujemo z nelagodjem v predelu dlesni in čeljusti, saj zobki prodirajo na površje prav skozi dlesni. Ko se zob pojavi pod površjem dlesni, lahko predel izraščanja zateče in postane nekoliko rdeč. Koristno je, če otroci grizljajo primerne predmete, ki olajšajo izraščanje zobkov. Simptomi se običajno pojavijo štiri dni pred tem in trajajo do tri dni po tem, ko je zob pokukal ven. V tem obdobju je lahko otrok zelo občutljiv.

Povečano slinjenje

Obdobje, ko otrokom izraščajo zobki, spremljata povečano izločanje sline in slinjenje. Slina v obdobju izraščanja vlaži občutljive dlesni. Dlesni so takrat zatečene, kar izzove neugodje, zato dojenčki tiščijo v usta prste in igrače. Čezmerno izločanje sline, ki vseskozi kaplja iz ust, lahko povzroči izpuščaje okrog ust.

V obdobju izraščanja zob koristijo:

- *Masaža: nežno natrite ali masirajte otrokove dlesni s čistim prstom, hladno krpico ali vlažno gazico.*
- *Hlajenje: otrok naj grize nekaj hladnega (in ne zamrznjenega), npr. ohlajeno kumaro. Pri tem bodite vseskozi v otrokovi bližini, da ne odgrizne prevelikega kosa in se mu ne zatakne v ustih ali grlu.*
- *Voda: dajte otroku piti hladno vodo.*
- *Trd predmet: pomaga lahko, če daste otroku nekaj trdega za grizljanje, npr. korenček ali grizalo.*
- *Brisanje sline: slinjenje je značilno za obdobje izraščanja zobkov. Da bi koža ostala suha in da bi preprečili draženje kože, je priporočljivo z mehko krpico nežno poplvinati sline.*

Uvoznik:
GORDO d.o.o.
Bezenskova ulica 72
2000 MARIBOR

Proizvajatelj:
BioClin BV, Delftechpark 55,
2628 XJ, Delft, Nizozemska

WWW.MULTI-MAM.SI

CE 0482 25°C 2°C G04321.5 C16